

ステップ名称	術前		手術日		術後1-3日目			
	1日前		基準日		1日後	2日後	3日後	4日後
	手術前日	手術当日(術前)	手術当日(術後)	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	
アウトカム								
医師指示		中止する必要がある薬を確認します	弾性ストッキング着用します。歩行可能となれば中止	弾性ストッキング着用します。歩行可能となれば中止	弾性ストッキング着用します。歩行可能となれば中止	弾性ストッキング着用します。歩行可能となれば中止	弾性ストッキング着用します。歩行可能となれば中止	体温や血圧を測定します(1日2回)
		体温や血圧を測定します(1日2回)	室内の移動に制限はありません	起床するまでフットポンプを着用します	起床するまでフットポンプを着用します	体温や血圧を測定します(1日2回)	お腹に入っているチューブは抜きます	体温や血圧を測定します(1日2回)
		シャワーか入浴をしてください	ベッドの上であれば、体を動かしてはいけません	ベッドの上であれば、手を動かしてはいけません	室内の移動に制限はありません	室内の移動に制限はありません	室内の移動に制限はありません	室内の移動に制限はありません
		夕食以後は食物は摂らないでください		手術室で尿遣バルーンを挿入します	体を拭いてきれいにします	体を拭いてきれいにします	希望があればシャワー可能です	希望があればシャワー可能です
		必要があれば、顔の切毛を行います			腫瘍後、尿遣バルーンを抜去します			
検査	検体検査							血液検査を行います。
	画像検査			術後手術室でX線撮影を行います	X線撮影を病室で行います。			X線撮影します
処方	内服					必要なものから特参薬の内服を再開します。		
	外用							
注射薬		術前に点滴をします	点滴2本	点滴4本	点滴3本	点滴2本	点滴2本	
			抗生剤点滴1本					
治療	治療				ドレーン管理	ドレーン管理	ドレーン管理	
	処置							
手術		手術を行います						
リハビリ		リハビリを術前から行います(術後2日の場合も)						
食事			水分は6時までお摂りいただけます	食事は絶食になります	少しずつ様子を見ながら水分をお摂りいただけます	飲水に制限はありません	流動食が始まります	
			水分は朝10時までお摂りいただけます	食事は絶食になります				
カルテ								
指導・説明	医師	同意書を出していただきます	弾性ストッキングをはきます	アクセサリ類・入れ歯・コンタクト				
	看護師	入院時オリエンテーションを行います						
	薬剤師	薬新薬より薬の説明があります						
	その他	栄養士から食事の指導を行います						
観察	観察	肺エア入り 嘔気 つかえ感 腹痛						
	観察			術前点滴換	午前中に医師が創部の診察をします	午前中に医師が創部の診察をします	午前中に医師が創部の診察をします	午前中に医師が創部の診察をします
観察	モニター							
	活動	シーツ交換を水曜にします。	シーツ交換を水曜にし	シーツ交換を水曜にし	シーツ交換を水曜にし	シーツ交換を水曜にし	シーツ交換を水曜にし	シーツ交換を水曜にし
	清潔							
	排遺			おしっこが管に入っています	おしっこを抜きます			
	実施事項							
	看護記録(熱変動)							
乾例転落								
NSI								
褥瘡								
インシデント								
文書		入院診療計画書に署名をお願いします						
その他								

