ステップ名称		TUR-Bt 6日目Ba抜去								
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
		入院日	手術当日術前	手術当日術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目Ba抜去	術後7日目　退院日
アウトカム											
医師指示		歩行可能 入浴可 体重測定・血圧測定・酸素濃度測定します	清拭します 入浴可 看護指示	清拭します 看護指示 心電図装着 帰室後3時間で飲水できます	清拭します 看護指示 心電図装着 院内フリー	看護指示 院内フリー	看護指示 院内フリー	看護指示 院内フリー	看護指示 院内フリー	看護指示 看護指示 院内フリー 院内フリー 朝に尿道の管を抜きます。	看護指示 看護指示 院内フリー 院内フリー 午前中に退院です。
検査	検体検査			病理検査の提出します。							
	画像検査										
	生理検査										
	その他										
処方	内服	持参薬を続行してください。 下剤の内服があります	必要なお薬を内服していただきます 手術当日、浣腸をします。		抗凝固剤以外の持参薬再開してください	抗凝固剤以外の持参薬再開してください 抗生剤止血剤の内服があります。	抗凝固剤以外の持参薬再開してください	抗凝固剤以外の持参薬再開してください	抗凝固剤以外の持参薬再開してください	抗凝固剤以外の持参薬再開してください	抗凝固剤以外の持参薬再開してください
	外用										
注射薬			点滴があります	点滴があります	夕方まで点滴があります。						
治療	治療										
	処置		弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します	弾性ストッキングを着用します 膀胱内洗浄後尿道の管を抜きます	弾性ストッキングを着用します
	手術										
リハビリ											
食事		夕食以後は食物は摂らないでください。	夕食以後は食物は摂らないでください。 最終水分10時まで 水分は　時まで飲めます	手術後後絶食です	朝から食事再開になります。						
カルテ											
指導・説明	医師										
	看護師	入院時オリエンテーションを行います 術前オリエンテーションを行います 弾性ストッキングの測定をします 術後に使用する物品の確認をします 同意書を提出していただきます 中止薬・絶食・爪切り・物品の確認します 弾性ストッキングのサイズを計測します 入院時オリエンテーションをします 術前オリエンテーションをします									
	薬剤師										
	その他	入院診療計画書									
観察	観察	血尿	残便感	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）	血尿 嘔気 疼痛 頭痛 発赤 知覚鈍麻（両下肢） 出血（創部）
観察	モニター										
	活動										
	清潔				身体を拭きます おしもを洗います	身体を拭きます おしもを洗います	身体を拭きます おしもを洗います	身体を拭きます おしもを洗います	身体を拭きます おしもを洗います	身体を拭きます おしもを洗います	
	排泄										
	実施事項										
	看護記録(熱型表)										
転倒転落											
NST											
褥瘡											
インシデント											
文書											
その他											